


# Инструкция Сиалор® аква



## Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

## Сиалор® аква

**Регистрационный номер:** ЛП-001997

**Торговое наименование:** Сиалор® аква

**МНН или группировочное название:** морская вода

**Лекарственная форма:** капли назальные

### Состав

**Активное вещество:**

Морская вода – 5 мл

**Вспомогательное вещество:**

вода очищенная – до 100 мл

**Раствор содержит:**

натрий – не менее 2,5 мг/мл

магний – не менее 0,35 мг/мл

кальций – не менее 0,008 мг/мл

калий – не менее 0,10 мг/мл

гидрокарбонаты – не менее 0,03 мг/мл

хлориды – не менее 3,5 мг/мл

сульфаты – не менее 1,5 мг/мл

### Описание

Прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный раствор.

**Фармакотерапевтическая группа:** носа заболеваний средство лечения

**Код АТХ:** R01AX10

### Фармакологическое действие

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, а также разжижению слизи и нормализации ее продукции бокаловидными клетками слизистой оболочки. Микроэлементы, входящие в состав морской воды, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют репаративные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов, способствует ее очищению.

### Показания к применению

- Аденоиды, острый, аллергический, вазомоторный ринит, хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа.
- Профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители транспортных средств, горячие и запыленные цеха).
- Промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств.
- Гигиенические процедуры полости носа (в т.ч. у грудных детей).

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.

### Способ применения и дозы

Препарат следует применять интраназально.

С лечебной целью (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух, носоглотки):

- детям до 1 года (грудным детям) – по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 раза в день;
- детям с 1 года до 7 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день;
- детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4–6 раз в день;
- взрослым – по 2–3 капли в каждый носовой ход 4–8 раз в день.

Курс лечения 2–4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С профилактической целью:

- детям до 1 года (грудным детям) – с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляций 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день;
- детям с 1 года до 7 лет – по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 раза в день;
- детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 2–4 раза в день;
- взрослым – по 2–3 капли в каждый носовой ход 3–6 раз в день.

С гигиенической целью: для размягчения и удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

### Побочное действие

Чувство дискомфорта в носовой полости в начале применения; возможны аллергические реакции.

### Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

### Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными препаратами, используемыми для лечения насморка.

### Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не описаны.

### Форма выпуска

Капли назальные.

По 2 мл, 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления, или из полиэтилена для медицинских целей, или из полиэтилена или полипропилена для инфузионных растворов и глазных капель. Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают навинчиваемыми крышками из полимерных материалов. На тубик-капельницы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной, писчей или текст этикетки наносят непосредственно на тубик-капельницу методом каплеустройной печати.

1, 10, 20 тубик-капельниц по 2 мл или 5, 10, 20 тубик-капельниц по 5 мл, 10 мл, или 1 тубик-капельницу по 10 мл, 15 мл, 20 мл с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

### Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 0 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия использовать в течение 14 суток.

### Условия отпуска

Отпускают без рецепта.



RENEWAL

### Производитель

ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

633623, Новосибирская область, р.п. Сузун,

ул. Комиссара Зяткова, д. 18

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru

### Претензии направлять по адресу:

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80